

4AT Deliryum Tarama Testi

Danışan: _____ Değerlendiren: _____ Tarih: _____

Klinisyen tarafından doldurulur. Her maddeyi gözlem ve kısa değerlendirmeye dayanarak puanlayın.

1. Uyanıklık: hastanın uyanıklık düzeyini gözleyin (aşırı uykulu veya ajite/huzursuz olma)

- ☐ Normal (uyanık, aşırı uykulu veya ajite değil) (0)
☐ Belirgin anormal (uykulu, uyandırmak güç veya ajite/huzursuz) (4)

2. AMT4: yaş, doğum tarihi, bulunulan yer ve içinde bulunulan yıl sorularındaki hata sayısı

- ☐ Hatasız (0) ☐ Bir hata (1) ☐ İki veya daha fazla hata ya da değerlendirilemedi (2)

3. Dikkat: aralık ayından geriye doğru ayları saymasını isteyin

- ☐ Yedi ay veya daha fazlasını doğru saydı (0) ☐ Başladı ancak yediden az saydı veya reddetti (1)
☐ Değerlendirilemedi (uykulu, dikkati dağınık) (2)

4. Akut değişim veya dalgalanan seyir: son 2 hafta içinde ortaya çıkıp son 24 saatte dalgalanan bilinç, biliş veya algı değişikliği

- ☐ Yok (0) ☐ Var (4)

Puanlama (klinisyen için)

Her maddede işaretlenen değer o maddenin puanıdır. Toplam puan aralığı 0–12.

0 Olası değil · 1–3 Olası bilişsel bozulma · 4–12 Olası deliryum

Toplam puan: _____

4AT © 2011–2014 MacLulich, Ryan, Cash. Creative Commons Atıf 4.0 (CC BY 4.0, creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lisansı ile kullanılır; kaynak: the4at.com. Bu Türkçe sürüm psisula tarafından çevrilmiş ve uyarlanmış; özgün formdan farklıdır.

Türkçe metin Psisula'nın çalışma çevirisidir. Sonuç tek başına tanı koydurmaz; klinik görüşmeyle birlikte değerlendirilmelidir.